Trockenvitamin-Konzentrat

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Wasserlöslich
zur zusätzlichen kurzfristigen Vitaminversorgung

Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion
bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale
Hoher Gehalt an Vitamin A und D

Zusammensetzung
Traubenzucker
Natriumchlorid

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0,6 %
Rohöle und –fette	0,2 %
Rohfaser	0,0 %
Rohasche	5,5 %
Lysin	0,0 %
Methionin	0,0 %
Natrium	2,0 %

Empfohlene Fütterungsdauer

Kühe:	Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.
Sauen:	7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung
Sonstige weibliche Säugetiere:	ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit
Weibliches Geflügel:	während des Östrus
Männliche Tiere:	während der Reproduktionsaktivität

Einsatzempfehlung
Bei besonderen Leistungsanforderungen, sowie in Belastungsphasen als Impfbegleitung und zur allgemeinen Vitalisierung und Rekonvaleszenz.

Fütterungshinweis
Das Diätergänzungsfuttermittel darf Vitamin A und Vitamin D in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehalts in Alleinfuttermitteln enthalten.
Dieses Diätergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Vitamin A an Zuchttiere nur bis 1 % der Tagesration verfüttert werden.
Die gleichzeitige Verabreichung von Vitamin D_2 ist unzulässig.
Vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.

mepro

Trockenvitamin-Konzentrat

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Vitamin A (3a672a)	1.000.000 I.E.
Vitamin D_3 (E671)	200.000 I.E.
Vitamin E (all rac-α-Tocopherylacetat) (3a700)	5.250 mg
Vitamin B_1 (3a820)	1.500 mg
Vitamin B_2 / Riboflavin	3.750 mg
Vitamin B_6 / Pyridoxinhydrochlorid (3a831)	2.000 mg
Vitamin B_{12} / Cyanocobalamin	7.500 µg
Vitamin K_3 (3a711)	1.750 mg
Vitamin C (3a300)	50.000 mg
Niacinamid (3a315)	18.000 mg
Ca-D-Pantothenat (3a841)	6.500 mg
Folsäure (3a316)	400 mg

Fütterungsempfehlung

5 g je Liter Trinkwasser

Gefahrenhinweis

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Stand: März 2017